

# 娃娃宁

## Wawa Ning

【处方】白术	90g	天竺黄	60g	茯苓	90g
僵蚕（炒）	45g	钩藤	60g	甘草	15g
薄荷	60g	朱砂	1.5g	党参	60g
琥珀	105g				

【制法】以上十味，朱砂水飞成极细粉，白术等九味粉碎成细粉；以上述粉末配研，过筛，混匀，即得。

【性状】本品为淡黄棕色至黄褐色粉末；气香。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶细小，不规则充塞于薄壁细胞，并有散在，长 $10\sim 32\mu\text{m}$ （白术）。不规则块片无色透明，边缘多平直，有棱角，遇水合氯醛液溶化（天竺黄）。不规则颗粒状团块和分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，细长，稍弯曲，有分枝，直径 $3\sim 8\mu\text{m}$ ，少数至 $16\mu\text{m}$ （茯苓）。韧皮纤维碎断多成束，偶见单个散离，淡黄色或无色，直径 $12\sim 26\mu\text{m}$ ，壁极厚，也有较薄的，孔沟不明显，胞腔线形（甘草）。非腺毛，多碎断，完整者 $1\sim 8$ 个细胞，稍弯曲，直径 $10\sim 43\mu\text{m}$ ，疣状突起较细密（薄荷）。不规则细小颗粒，暗红棕色，有光泽，边缘暗黑色（朱砂）。

（2）取本品 $1\text{g}$ ，加正己烷 $30\text{ml}$ ，超声处理 $10$ 分钟，滤过，滤液回收溶剂至干，残渣加正己烷 $1\text{ml}$ 使溶解，作为供试品溶液。另取白术对照药材 $0.5\text{g}$ ，加正己烷 $2\text{ml}$ ，超声处理 $10$ 分钟，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2015年版通则0502）试验，吸取上述新制备的两种溶液各 $20\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（ $60\sim 90^\circ\text{C}$ ）-乙酸乙酯（ $50:1$ ）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 $5\%$ 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（3）取本品 $1\text{g}$ ，加入浓氨试液 $2\text{ml}$ ，浸泡 $30$ 分钟，加入三氯甲烷 $50\text{ml}$ ，加热回流 $2$ 小时，放冷，滤过，滤液回收溶剂至干，残渣加乙醇 $2\text{ml}$ 使溶解，作为供试品溶液。另取钩藤对照药材 $0.5\text{g}$ ，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2015年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各 $5\sim 10\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（ $7:3$ ）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（ $365\text{nm}$ ）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（4）取本品 $1\text{g}$ ，加乙醚 $40\text{ml}$ ，加热回流 $1$ 小时，滤过，弃去醚液，药渣加甲醇 $30\text{ml}$ ，加热回流 $1$ 小时，滤过，滤液回收溶剂至干，残渣加水 $40\text{ml}$ 使溶解，用正丁醇提取三次，每次 $20\text{ml}$ ，合并正丁醇液，用水洗涤三次，每次 $20\text{ml}$ ，弃去水液，正丁醇液回收溶剂至干，残渣加甲醇 $1\text{ml}$ 使溶解，作为供试品溶液。另取甘草对照药材 $0.5\text{g}$ ，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2015年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各 $2\mu\text{l}$ ，分别点于同一用 $1\%$ 氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水（ $15:1:1:2$ ）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 $10\%$ 硫酸乙醇溶液，在 $105^\circ\text{C}$ 加热至斑点显色清晰，置日光及紫外灯（ $365\text{nm}$ ）下检视。供试品色谱中，在于对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点及荧光斑点。

【检查】应符合散剂项下有关的各项规定（中国药典2015年版通则0115）

【含量测定】取本品 $20$ 袋内容物，精密称定，混匀，取约 $5\text{g}$ ，精密称定，置锥形瓶中，加硫酸 $60\text{ml}$ 、硝酸钾 $13\text{g}$ ，加热至溶液呈淡黄白色至近无色，放冷，加水 $50\text{ml}$ 混匀，

放冷，滴加 1%高锰酸钾溶液至显粉红色，2 分钟内不消失，再滴加 2%硫酸亚铁溶液至粉红色消失后，加硫酸铁铵指示液 2ml，用硫氰酸铵滴定液（0.01mol/L）滴定。每 1ml 硫氰酸铵滴定液（0.01mol/L）相当于 1.163mg 的硫化汞（HgS）。

本品每袋含朱砂以硫化汞（HgS）计，应为 1.10~1.28mg。

**【功能与主治】** 解热镇惊，祛风止搐。用于感冒发热，惊风痉挛，呕吐，绿便，脾胃虚弱等。

**【用法与用量】** 六个月~一周岁，一次 1 包，六个月以下小儿酌减，一日 2~3 次。

**【注意】** 忌食辛辣物。

**【规格】** 每袋装 0.5g。

**【贮藏】** 密封。

处方意见稿