

感冒疏风丸

Ganmao Shufeng Wan

| | | |
|--------------|------------|--------|
| 【处方】 蜜麻黄 50g | 苦杏仁 75g | 桂枝 75g |
| 酒白芍 125g | 紫苏叶 50g | 防风 75g |
| 桔梗 50g | 炒谷芽 125g | 甘草 50g |
| 大枣（去核） 75g | 生姜（捣碎） 50g | 独活 50g |

【制法】 以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100g 粉末加炼蜜 40~50g 与适量的水，泛丸，干燥，活性炭包衣，制成水蜜丸；或加炼蜜 120~140g，制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑色的水蜜丸或黄褐色至黑褐色的大蜜丸；味甜、苦、略麻涩。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶直径 18~32 μm ，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。石细胞类方形，壁一面菲薄。油管含金黄色分泌物，直径 17~60 μm 。联结乳管直径 14~25 μm ，含淡黄色颗粒状物。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞橙黄色，贝壳形，壁较厚，较宽一边纹孔明显。

（2）取大蜜丸 2 丸，剪碎，或水蜜丸 12g，研碎，加硅藻土 6g，研匀，加乙醇 40ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，用水饱和的正丁醇提取 3 次，每次 10ml，合并正丁醇提取液，用水洗涤 3 次，每次 10ml，弃去水液，正丁醇液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，加适量中性氧化铝，水浴上拌匀干燥，置预先处理好的中性氧化铝小柱（200~300 目，1g，内径 10~15mm）上，以甲醇 20ml 洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加乙醇 0.5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2015 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（20:2.5:5:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（中国药典 2015 年版通则 0108）。

【功能与主治】 辛温解表，宣肺和中。用于风寒感冒，发热咳嗽，头痛怕冷，鼻流清涕，骨节酸痛，四肢疲倦。

【用法与用量】 口服，水蜜丸一次 6g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 大蜜丸每丸重 9g

【贮藏】 密封。