

健胃消炎颗粒

Jianwei Xiaoyan Keli

【处方】党参	茯苓	白术(麸炒)
白芍	丹参	赤芍
白及	大黄	木香
川楝子	乌梅	青黛

【制法】以上十二味，大黄，青黛粉碎成细粉；其余党参等十味加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，浓缩至相对密度为 1.35~1.40（50℃测）的清膏。取清膏 1 份，蔗糖 3 份，糊精 1 份及大黄、青黛（二味药粉先与蔗糖、糊精配研均匀）混匀，制成颗粒，干燥，得约 1000g（有糖型），或取清膏烘干，粉碎加大黄、青黛及适量辅料，混匀，制成颗粒，干燥，得约 250g（无糖型），分装，即得。

【性状】本品为棕绿色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

【鉴别】（1）取本品 10g，加氯仿 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取大黄对照药材粉末 0.2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2015 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 20 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-石油醚-乙酸乙酯-甲醇（3:1:1.5:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，在紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取靛蓝与靛玉红对照品，加氯仿制成每 1ml 中各含 1mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2015 年版通则 0502）试验，吸取【鉴别】（1）项下的供试品溶液及上述对照品溶液各 20 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以苯-甲醇（9:1）为展开剂，展开，取出，晾干。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（3）取本品 10g，加乙酸乙酯 20ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解。作为供照品溶液。另取芍药苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2015 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以氯仿-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40:5:10:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%

香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。

【检查】除不做溶化性检查外，其他应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2015 年版通则 0104）

【功能与主治】健脾和胃，理气活血。用于脾胃不和所致的上腹疼痛、痞满纳差以及慢性胃炎见上述证候者。

【注意】脾胃虚寒或寒湿中阻者不宜服用。

【用法与用量】饭前开水冲服，一次 20g（有糖型）或 5g（无糖型），一日 3 次或遵医嘱。

【规格】（1）每袋重 10g（有糖型） （2）每袋重 5g（无糖型）

【贮藏】密封。

申请单位：江苏苏中药业集团股份有限公司

复核单位：江苏省食品药品监督检验研究院