

附件 2：《新疆维吾尔自治区中药维吾尔药饮片炮制规范》
(2020 年版) 拟新增品种和品规 (按笔画顺序排列)

丁香罗勒子

Dingxiangluolezi

ئۇرۇقى مشكى پەرەنجى

GRATISSIMI FRUCTUS

本品为唇形科植物丁香罗勒 *Ocimum gratissimum* L. 的果实。秋季采收，晒干。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈椭圆形或长卵形，略扁，长 1.3~1.5mm，宽 0.6~0.8mm，果皮黑褐色或棕色，略有光泽，解剖镜下可见密布细小颗粒状突起，水浸后强烈粘液化。先端钝圆，基部具三棱，中心有灰白色果脐。种子黄白色，种皮薄膜质，子叶 2，类白色，有油性。气微，味微辛，有清凉感。

【鉴别】 本品粉末黑褐色。黏液细胞，类长方形，向外延伸成黏液柱，可见黏液质纹理。外果皮细胞红棕色，断面观细胞扁平，细胞壁波状弯曲；表面观呈多角形，具细纹理。石细胞成片，长 30~45 μ m，镶嵌于外果皮细胞内侧，类圆三角形，多角形或不规则形，无色，壁厚，具细纹理，胞腔小，于角隅处常可见棕色外果皮残留。中果皮含晶细胞成片，壁厚，内含矩圆形草酸钙方晶。外种皮细胞棕色，多角形，边缘清晰。胚乳细胞无色，子叶细胞不规则形，含糊粉粒和脂肪油滴。

【检查】 水分 不得过 8.0% (《中国药典》2020 年版四部通则

0832 第一法)。

酸不溶性灰分 不得过 15.0% (《中国药典》2020 年版四部通则 2302)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法 (《中国药典》2020 年版四部通则 2201) 项下的热浸法测定, 用 50%乙醇溶剂, 不得少于 3.0%。

【性味或药性】 二级末干热。

【功能与主治】 生干生热, 补脑通阻, 安心除烦, 通鼻解表, 止咳化痰, 补胃开胃, 散气补肝。主治湿寒性或黏液质性脑部疾病, 如脑虚脑阻, 心悸恐惧, 鼻塞感冒, 咳嗽多痰, 胃虚纳差, 肝虚气滞等。

【用法与用量】 内服: 5~7g。外用: 适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处, 防蛀。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2014YC-0002。

飞 燕 草

Feiyancao

هندي جه دوار

CONSOLIDAE AJACIS RADIX

本品为毛茛科植物飞燕草 *Consolida ajacis* (L.) Schur 的干燥根。7~8 月时采挖，除去须根，洗净，干燥。

【炮制】 除去杂质，切片。

【性状】 本品呈类圆形或椭圆形的厚片，外表皮灰棕色至黑棕色，皱缩，有侧根及子根脱离后的痕迹。质坚实，断面类白色或浅灰棕色，角质样，形成层明显。气微，味辛辣、麻舌。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用 30%乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【性味】 三级干热，味辛，有毒。

【功能与主治】 生干生热，祛寒止痛，消炎退肿，消除乃孜来，补脑强心，消癥除癰，强筋健肌，防疫解毒，增强性欲，利尿排石。主治湿寒性或黏液质性疾病，如各种寒性疼痛，腋下肿痛，颈淋巴结核，咽喉肿痛，扁桃腺肿痛，感冒乃孜来，瘫痪，筋肌松弛，癥病，

小儿癫痫，鼠疫，霍乱，性欲低下，寒性尿闭，各种结石。

【用法与用量】 0.5～1g。外用适量。

【注意事项】 对热性气质者有害，可引起头痛和肠道溃疡，矫正药为新鲜牛乳、大麦煎汁。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准2017YC-0006。

牛 蒡 根

Niubanggen

ARCTII LAPPAE RADIX

本品为菊科植物牛蒡 *Arctium lappa* L.的干燥根。夏秋季采挖 2 年以上的根，洗净，晒干。

【炮制】 除去杂质，切片。

【性状】 本品呈类圆形厚片，表面棕褐色或黑褐色，具纵皱纹。质硬而脆，断面疏松有裂隙或略平整而致密，皮部黑褐色，木部黄白色，形成层明显。气微，味微苦。

【鉴别】 （1）本品粉末灰棕色。导管众多，多为网纹导管，直径 21~113 μm 。木纤维细长，末端稍尖，壁较厚木化，孔沟不明显，胞腔线形且多呈束存在，直径 14~35 μm 。薄壁细胞类表面观类长方形、多角形或类圆形。菊糖多见，呈扇形或类长方形。

（2）取本品粉末 0.5g，加乙醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取牛蒡苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取供试品溶液 3 μl 和对照品溶液 5 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（40 : 8 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 12.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 14.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的冷浸法，不得少于 24.0%。

【性味与归经】 味苦、微甘、性凉。归肺、心经。

【功能与主治】 散风热，消肿毒。主治风热感冒，头痛，咳嗽，热毒面肿，咽喉肿痛，齿龈痹痛，癰疽积块，痈疔恶疮，痔疮脱肛。

【用法与用量】 内服，煎汤或研末酒浸，6～15 克。外用适量，熬膏外敷或煎水洗。

【贮藏】 置阴凉通风干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0001。

毛 罗 勒

Maoluole

رهيهان توكلكوك

OCIMI BASILICI HERBA

本品为唇形科植物疏柔毛罗勒 *Ocimum basilicum* var. *pilosum* (Willd.) Benth. 的干燥地上部分。8~9 月采割地上部分，除去泥土，阴干。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性状】 本品呈长短不等的短段，茎呈方柱形，可见对生分枝或分枝痕，表面淡棕黄至紫棕色或淡绿色至黄绿色，被短柔毛；中央具白色疏松的髓部；质脆易折断，断面纤维性。叶对生，多脱落、破碎，叶柄及表面稀被疏短柔毛，背面具腺点。小坚果，长约 2mm，卵形至长圆形，顶端钝，下端具 1 尖突，腹面微具棱，棕色至黑褐色。气芳香，味辛凉。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕绿色。腺鳞头部扁圆形，8 个细胞组成，直径可达 100 μ m，内含黄棕色分泌物，柄单细胞。小腺毛头部单细胞，柄单细胞。非腺毛 1~11 细胞，顶端处稍膨大。纤维单个散在或成束，无色或淡棕色至红棕色；有的周围细胞含有草酸钙方晶。苞片上表皮细胞深波状弯曲。花粉粒类扁球形，外壁两层，具极明显的大网状雕纹，具 6 孔沟。外果皮细胞表面观多角形，壁黏液化，胞腔含棕色物。中果皮细胞壁厚，内含矩圆形草酸钙方晶。叶表皮细胞

波状弯曲，内含草酸钙方晶。螺纹导管多见，少有网纹导管、梯纹导管。

(2) 取本品粉末 1g，加甲醇 15ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液浓缩至约 1ml，作为供试品溶液。另取芦丁对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2020 年版四部通则 0502) 试验，吸取上述供试品溶液 5 μ l，对照品溶液 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-甲酸-水(8 : 1 : 1 : 1) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，待乙醇挥干后，置紫外光灯(365nm) 下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 7.0%(《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 16.0%(《中国药典》2020 年版四部通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 4.0%(《中国药典》2020 年版四部通则 2302)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》2020 年版四部通则 2201)项下的热浸法测定，用 50%乙醇作溶剂，不得少于 11.0%。

【性味】 二级干，一级热。味辛。

【功能与主治】 具纯化异常血液质和清除胆液质，止泻固涩、补脑、明目、滋补肠胃、通阻、悦志、养心等功效，用于蚊虫叮咬、湿热性或血液质性疾病，如胃、肠源性腹泻、脑虚视弱、迎风流泪等。

【用法与用量】 10~16g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准
2017YC-0010。

巴 旦 仁 油

Badanrenyou

یہی بادام

AMYGDALI DULCIS OIL

本品为蔷薇科植物扁桃（巴旦杏）*Amygdalus communis* L.的成熟种仁用压榨法得到的脂肪油。8~9 月果实成熟时采收，剥取种仁，用压榨法得到脂肪油。

【炮制】 取脂肪油，滤过，取滤液或静置，取上清液。

【性状】 本品为淡黄色的澄清液体；气香，无异味。冷时常发生浑浊或析出结晶，加温后又澄清。

本品能与乙醚、二氯甲烷、乙酸乙酯任意混溶，在水、甲醇、乙醇中几乎不溶。

相对密度 应为 0.907~0.928（《中国药典》2020 年版四部通则 0601）。

折光率 应为 1.4691~1.4694（《中国药典》2020 年版四部通则 0622）。

【检查】 酸值 应不大于 2.0（《中国药典》2020 年版四部通则 0713）。

皂化值 应为 180~240（《中国药典》2020 年版四部通则 0713）。

碘值 应为 90~105（《中国药典》2020 年版四部通则 0713）。

【性味】 性平，一级热。味淡。

【功能与主治】 祛寒，止痛，消肿。用于寒性气质引起的头痛，失眠，耳鸣，关节炎等。

【用法与用量】 内服适量。外用，酌情取适量涂抹于患处。

【贮藏】 遮光，密封，置阴凉处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准
2017YC-0003。

甘草 味 胶

Gancaoweijiao

ئەنزۇرۇت

ASTRAGALI SACOCOLLAE GUMMI

本品为豆科植物肉质黄芪 *Astragalus sarcocolla* Dymock 的干燥树胶。全年均可采收，阴干。

【炮制】 除去杂质，砸成小块。

【性状】 本品呈不规则团块或细小颗粒状。表面黄白色至深红色，略具玻璃样光泽。质脆，易碎，破碎面不平坦，其色与表面基本一致而较新鲜。气微，味特异，微甜而后苦。

【鉴别】 （1）本品粉末淡黄至红棕色。不规则小团块无色或淡黄色至淡棕红色，久置融化。可见细长缠绕状菌丝，无色，直径约 5 μ m，遇水合氯醛液溶化。

（2）取本品 2g，研磨成粗粉，加入 15ml 冷水，振摇，结果有泡沫产生。

（3）取本品少量进行灼烧，燃烧时先成黑色油状，并有明亮的黄色火焰和黑烟产生。

【检查】 水分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》2020 年版四部通则

2302)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的冷浸法测定，用 50%乙醇作溶剂，不得少于 65.0%。

【性味】 二级干热。味辛、微甜。有毒。

【功能与主治】 生干生热，清除多余黏液质，散气通阻，消炎退肿，除脓愈疮。主治湿寒性或黏液质性疾病，如关节疼痛，坐骨神经痛，各种化脓性疮疡，各种眼部疮疡，迎风流泪，耳痛，耳道流脓。

【用法与用量】 1～3g。外用适量。

【注意】 本品不宜与云母同用。可配阿拉伯胶、巴旦仁油内用，不可单服此品，本品服用 4g 应配 8g 巴旦仁油。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0007。

卡 西 卡 甫 枣 （酸 枣）

Kaxikafuzao (Suanzao)

چیلان

ZIZIPHI SPINOSAE FRUCTUS

本品为鼠李科植物酸枣 *Ziziphus jujuba* Mill. Var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chow 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，晒干。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈球形或短矩圆形，直径 0.7~1.5cm。表面暗红色，有光泽，或具不规则皱纹。基部凹陷，有一小圆形果梗痕。外果皮薄，中果皮棕黄色或淡褐色，肉质少。味甜、微酸。果核卵圆形，长 0.8~1.2 cm，宽 0.5~1.0 cm，两端钝或一端略尖，表面棕色，略凹凸不平，质坚硬。种子呈扁圆形或扁椭圆形，长 5~9mm，宽 5~7mm，厚约 3mm。表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽。大部分一面较平坦，中间有 1 条隆起的纵浅纹；另一面稍突起。

【鉴别】 （1）本品去核粉末棕色。外果皮棕色至棕红色；表皮细胞表面观类方形、多角形或长方形，胞腔内充满棕红色物，断面观外被角质层；表皮下细胞黄色或黄棕色，类多角形，壁稍厚。中果皮薄壁细胞含草酸钙簇晶和方晶，簇晶直径 30~50 μ m，方晶菱形或不规则形，直径 60~120 μ m。

（2）取本品粉末 4g，加乙醇 25ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇 2ml 使溶解，滤过，取续滤液，作为供试品溶液。另取白桦脂酸对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）

试验,吸取上述供试品溶液 10 μ l 和对照品溶液 5 μ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸(14 : 4 : 0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以 10%硫酸乙醇溶液,加热至斑点显色清晰。分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点或荧光斑点。

(3) 取〔鉴别(2)〕项下溶液作为供试品溶液。另取熊果酸对照品,加无水乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2020 年版四部通则 0502)试验,吸取上述供试品溶液 10 μ l 和对照品溶液各 5 μ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上。将薄层板点样的一端浸入 1%碘-二氯甲烷溶液里约 15mm,使溶液浸过点样点后迅速取出,立即覆盖一玻璃板,30 分钟后取下玻璃板,热风吹干,以环己烷-三氯甲烷-乙酸乙酯-冰醋酸(20 : 5 : 8 : 1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以 10%硫酸乙醇溶液,加热至斑点显色清晰。分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 16.0% (《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 3.0% (《中国药典》2020 年版四部通则 2302)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》2020 年版四部通则 2201)项下的热浸法规定,用 70%乙醇作溶剂,不得少于 60.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法(《中国药典》2020 年版四部通则 0512)测定。

色谱条件与系统适用性实验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.05%磷酸溶液(70 : 30)为流动相;柱温为 30℃;检

测波长为 205nm。理论板数按白桦脂酸峰计算应不低于 6000。

对照品溶液的制备 取白桦脂酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）3g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入乙醇 25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 250W，频率 40KHz）30 分钟，取出，放冷，再称定重量，用乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含白桦脂酸（ $C_{30}H_{48}O_3$ ）不得少于 0.020%。

【性质】 一级干寒。

【功能与主治】 清血排毒，清热消炎，止咳化痰，补身安神，除疹止痒。用于热性或血液质性或胆液质性各种病证，如血热腐败、脓液成块，发热发烧、肺炎、胸膜炎，乃孜来性感冒、咳嗽顽痰，体虚失眠，皮疹瘙痒等。

【用法与用量】 15～25g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0011。

白皮松子仁

Baipisongziren

چېلغوزا

PINI GERARDIANAE SEMEN

本品为松科植物西藏白皮松 *Pinus gerardiana* Wall. 的种子仁。果实成熟后采收，晒干，打下种子，除去种皮，收集种仁。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈长椭圆或长卵形，略扁，长 1~2cm，直径 4~8mm。表面白色至淡棕色，残留外包膜质内种皮，淡棕色。顶端略尖，基部钝圆。胚乳中央可见淡黄色的胚；具多个子叶，6~9 居多。气微，味微甘。

【检查】 水分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0823 第二法）。

过氧化值 不得过 0.2（《中国药典》2020 年版四部通则 2203）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用 95%乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性质】 一级湿热，味甘。

【功能与主治】 生湿生热，热身强筋，填精壮阳，补身壮腰，止咳平喘。主治干寒性或黑胆质性疾病，如寒性瘫痪、面瘫，干性精少阳痿、体虚腰痛、咳嗽、哮喘等。

【用法与用量】 内服：7~8g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2014YC-0001。

包 尔 胡 特 果 实

Baoerhute Guoshi

باۋر قۇرت

RHAMNI SONGORICAE FRUCTUS

本品系哈萨克族民间药材，为鼠李科植物新疆鼠李 *Rhamnus Songorica* Gontsch 的干燥果实。秋季果实成熟后采收，洗净，阴干。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈类圆形或近球形，直径约 4~7mm，表面黑紫色，有光泽且有皱缩纹。果肉薄而疏松，内核坚硬，通常有果核 2~3 枚，果核卵圆形，背部有狭沟，基部有宿存的萼筒；果梗长约 2~3mm。气微，味微苦涩。

【鉴别】 (1) 本品粉末紫褐色，非腺毛 1~6 细胞，且非腺毛较多。草酸钙结晶较多，呈正方形，针形或多面形，方晶直径 6~14 μ m，针晶长度 10~35 μ m；石细胞类圆形，直径 18~38 μ m，壁厚，胞腔大。果皮薄壁细胞不规则，有不定式气孔，充满众多的紫褐色物及少量颗粒状物。螺纹导管多见。

(2) 取本品粉末 1g，加 80% 甲醇 50ml，加热回流 1 小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10ml 使溶解，用乙醚提取 2 次，每次 10ml，弃去乙醚液，水液加稀盐酸 10ml，置水浴中水解 1 小时，取出，迅速冷却，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，用水 30ml 洗涤，弃去水洗液，乙酸乙酯液蒸干，残渣加甲

醇 10ml 使溶解，作为供试品溶液。另取山柰酚对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲酸（10 : 3 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 的三氯化铝乙醇溶液，在 105℃ 加热数分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法，以 70% 的乙醇测定，不得少于 30.0%。

【性味与归经】 性平，味甘，微苦。

【功能与主治】 润肠通便，清热解毒，疏肝保肝，调节血脂。治疗肠燥便秘，习惯性便秘，高脂血症，酒精性肝病。

【用法与用量】 内服：煎汤，10~30 克。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0002。

对 叶 大 戟 草

Duiyedajicao

سۈتلۈك ئوت

EUPHORBIAE SORORIAE HERBA

本品为大戟科植物对叶大戟 *Euphorbia sororia* Schrenk 的干燥全草。花果期采收，除去泥沙，阴干。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性状】 本品呈不规则的段，茎扁圆柱形，表面灰绿色，有细纵纹和 1 条明显的纵沟，分枝处节间膨大，节上有叶痕及茎枝痕，断面黄白色，髓部疏松或中空；叶多破碎，无柄，完整叶片呈线形或线状椭圆形，全缘。花序单生于二歧聚伞分枝的顶端；总苞狭钟状，无柄，边缘 4 裂，裂片近三角形；淡黄色，雄花数枚，伸出总苞之外；雌花 1 枚，子房柄长 3~5mm；子房光滑无毛；花柱 3，分离；柱头 2 裂。果实圆三棱形，中央处具短花柱，表面光滑，灰黄白色至黄棕色。种子卵形或椭圆形，白色或棕褐色，表面具有凹凸不平的胡桃核样纹理，腹面具一槽沟。质脆，气微，味淡。

【鉴别】 （1）本品粉末黄绿色。茎表皮细胞类长方形，内含方晶，气孔不定式。果皮表皮细胞浅棕色，呈类长方形交错排列；果皮下表皮细胞呈多角形，壁较厚。种皮表皮细胞黄棕色，壁厚，多角形或类椭圆形。花粉粒类球形，具 3 孔沟，表面有细密点状雕纹，直径 23~46μm。纤维成束。螺纹导管众多。

（2）取本品粉末 2g，加甲醇 30ml，超声处理 20 分钟，过滤，滤液蒸干，残渣加 1ml 甲醇使溶解，作为供试品溶液。另取山柰素对

照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述供试品溶液 5~10 μ l 和对照品溶液 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-甲酸（8 : 5 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 18.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法，用乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0512）测定。

色谱条件与系统适应性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.4%磷酸溶液（52 : 48）为流动相；检测波长为 360nm。理论板数按山柰素峰计算应不低于 4000。

对照品溶液的制备 取山柰素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含山柰素 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过二号筛）约 10g，精密称定，置 500ml 圆底烧瓶中，精密加入甲醇 100ml，密塞，称定重量，置 70℃水浴回流 2 小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过。精密量取滤液 8ml，置 50ml 锥形瓶中，精密加入 25%盐酸 2ml，

密塞，精密称定，置 80℃水浴回流 1 小时，放冷，精密称定，用甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含山柰素（C₁₆H₁₂O₆）不得少于 0.025%。

【性质】 二级干热。

【功能与主治】 利水消肿，降压清脑，泻下，杀虫。用于大便秘结，尿频，高血压头痛、头晕，肝硬化，水肿以及疮疖肿痛。

【用法与用量】 6～10g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0009。

芝 麻 菜 子

Zhimacaizi

زاغون ئورۇغى

ERUCAE SEMEN

本品为十字花科植物芝麻菜 *Eruca sativa* Mill. 的干燥成熟种子。夏末秋初果实成熟时采割植株，晒干，打下种子。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈椭圆形、卵圆形，有的略扁，长 2~3mm，宽 1.5~2mm，表面灰黄色至灰黑色，具细密的纹理，一端有明显突起的种脐，呈线状，有的具类白色的附着物，破开压碎后有黄色、绿白色的子叶，具油性。气微，味辛。

【鉴别】 （1）本品粉末黄绿色。种皮栅状细胞淡黄色，类椭圆形。种皮表皮细胞棕黄色，表面观呈多角形，外壁波状增厚。内胚乳细胞壁厚，内含糊化淀粉粒。子叶细胞含脂肪油滴。

（2）取本品粉末 1g，加甲醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芥子碱硫氰酸盐对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（10 : 2 : 3）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 杂质 不得过 3.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2301）。

水分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

过氧化值 不得过 0.12（《中国药典》2020 年版四部通则 2303）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【含量测定】 脂肪油 取本品粗粉 1g，精密称定，置索氏提取器中，加乙醚适量，加热回流提取（8 小时）至脂肪油提尽，收集提取液，置已干燥至恒重的蒸发皿中，在水浴上低温蒸干，在 100℃干燥 1 小时，移置干燥器中，冷却 30 分钟，精密称定，计算，即得。

本品按干燥品计算，含脂肪油不得少于 18.0%。

【性质】 二级干热。

【功能主治】 生干生热，祛寒壮阳，通尿通经，燥湿开胃，散气除胀，热肤除斑。主治湿寒性或黏液质性疾病，如寒性阳痿，小便不利，经水不下，湿性纳差，气结腹胀，雀斑，白癜风等。

【用法用量】 5~7g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0007。

羊 脂

Yangzhi

يېغى قوي

SEVUM

本品为牛科动物绵羊 *Ovis aries* L.尾部脂肪，经文火熔化制成。

【炮制】 切块，经文火熔化，滤过，不断搅拌至冷。

【性状】 本品呈均匀脂状，白色、触之松软细腻，有微弱的特殊羊膻味。入口即溶。

【检查】 酸值 应不大于 2.0（《中国药典》2020 年版四部通则 0713）。

皂化值 180.0～220.0（《中国药典》2020 年版四部通则 0713）。

碘值 28.0～48.0（《中国药典》2020 年版四部通则 0713）。

【性味】 干热，味甘。

【功能与主治】 补虚、散气。主治羸瘦，腹泻、脱肛、产后腹痛、祛斑、皮肤病。常用于小儿风寒咳嗽、腹部冷痛等。

【用法与用量】 内服适量。外敷适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0009。

芫 荽 子

Yuansuizi

ئۈرۈقى ئاشكۆكى

CORIANDRI FRUCTUS

本品为伞形科植物芫荽 *Coriandrum sativum* L. 的干燥成熟果实。
果实成熟时采收，晒干。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品为双悬果，呈圆球形或椭圆形，长 3~6mm，直径 2~5mm。表面黄绿色、淡黄棕色或黄棕色，具明显纵直的次生棱脊 10 条及不甚明显而成波状弯曲的初生棱脊 10 条，相间排列。顶端可见柱头残迹及 5 个萼齿残痕，基部具凹陷的果柄痕或小果柄。分果中央下凹，两侧呈弧形弯曲。气微香，味辛。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄绿色。内果皮镶嵌细胞，细胞狭长，壁薄，常数个细胞为一组，以长轴作不规则方向嵌列。油管碎片黄棕色或红棕色，分泌细胞多角形，含棕色分泌物。中果皮网状细胞淡黄色，类长方形或多角形，含草酸钙小簇晶，直径 3~9 μ m。油滴极多。

取本品粉末 1g，加甲醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芫荽子对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述供试品溶液与对照药材溶液各

10 μ l、对照品溶液 5 μ l，分别点在同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水（10 : 6 : 1 : 2）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，置紫外灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 杂质 不得过 3%（《中国药典》2020 年版四部通则 2301）。

水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【含量测定】 挥发油 照挥发油测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2204）测定。

本品含挥发油不得少于 0.50%（ml/g）。

绿原酸 照高效液相色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相 A，以 0.4% 磷酸溶液为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 327nm。理论板数按绿原酸峰计算应不

低于4000。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0～10	11→20	89→80
10～25	20→30	80→70
25～35	30→11	70→89

对照品溶液的制备 取绿原酸对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率350W，频率59kHz）20分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含绿原酸（C₁₆H₁₈O₉）不得少于0.020%。

【性味与归经】 辛、平。归脾、胃经。

【功能与主治】 发表，透疹、开胃。用于感冒鼻塞，痘疹透发不畅，饮食乏味，齿痛。

【用法与用量】 5～10g。外用适量，煎汤含漱或熏洗。

鸡 蛋 黄

Jidanhuang

سېرىقى تۇخۇم

GALLI VITELLI OVI

本品为雉科动物家鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson 的卵黄。

【炮制】 将鸡蛋煮熟，取蛋黄，揉碎、烤干或烘干至出油。

【性状】 本品为大小不等的块状物，表面黄色或棕黄色，细腻而稍有光泽，富油性，质松，手捻易碎，断面黄色或棕黄色。气清香、微腥，味淡。

【鉴别】 取本品 3g，加正己烷-异丙醇-水（40 : 50 : 8）混合溶液 20ml，振摇 40 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取胆固醇对照品，加正己烷-异丙醇-水（40 : 50 : 8）混合溶液制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 板上，以正己烷-乙醚-冰醋酸（7 : 3 : 0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以硫酸铜试液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 14.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 4.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定（《中国药典》2020 年版四部

通则 2201) 项下热浸法测定, 用乙醇作溶剂, 不得少于 25.0%。

【性味】 一级湿热, 味甘。

【功能与主治】 生湿生热, 补身壮阳, 生血填精, 止泻止痢, 消炎愈伤, 生发乌发, 增加色素。主治干寒性或黑胆质性疾病, 体虚阳痿, 血虚精少, 小儿腹泻, 烧伤烫伤, 脱发白发, 皮肤白斑, 白癜风。

【用法与用量】 16~32g。外用适量。

【贮藏】 置干燥冷处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0002。

刺 山 柑 果

Cishanganguo

مېۋىسى كەبەر

CAPPARIDIS SOINOSAE FRUCTUS

本品为山柑科植物刺山柑 *Capparis spinosa* L. 近成熟干燥果实，夏秋季采收，晒干。

【炮制】 除去杂质，用时破碎。

【性状】 本品呈倒卵形、椭圆形或长椭圆形，长 1.4~4cm，直径 0.8~1.8cm。顶端钝圆或平截，基部楔形。可见果梗痕或残留果梗，果梗或具一膨大的节，直径为 3~5mm；果皮表面粗糙，具凸起的粒状轮廓。全体有褶皱状纵棱 6~8 条，基部较明显；表面黄色至棕褐色。体轻，质坚脆。果肉浅棕黄色，果皮薄，常与种子紧密粘结，内有种子 40~60 枚，肾形至球形，直径 2~3mm，常相互粘结成团，种皮浅黄色、红棕色或深褐色，种子胚乳黄白色，富油性。气微，味微苦而略刺舌。

【鉴别】 取本品粉末 5g，加甲醇 50ml，浸泡 2 小时，超声处理 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 50ml 使溶解，置分液漏斗中，用乙酸乙酯萃取 2 次，每次 30ml，弃乙酸乙酯液；水溶液用水饱和的正丁醇振摇提取 3 次，每次 30ml，合并正丁醇提取液，水浴蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取腺苷对照品，加甲醇溶液制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取供试品溶液 12 μ l，对

照品溶液 1 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲醇-异丙醇-浓氨溶液（10 : 6 : 5 : 3 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法，用乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性质】 二级干热。

【功能与主治】 消散寒气，软坚利尿，止痛，通经。用于寒湿性或黏液质性疾病，肢体麻木，关节疼痛，坐骨神经痛，尿闭水肿，月事不通。

【用法与用量】 内服 3～6g，外用 6～18g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0005。

欧 矢 车 菊

Oushicheju

بههمن ئاق

CENTAUREAE BEHEN RADIX

本品为菊科植物欧矢车菊 *Centaurea behen* L. 的干燥根。夏、秋二季采挖，除去地上茎，洗净，晒干。

【炮制】 除去杂质，切片。

【性状】 本品呈类圆形或不规则的厚片。外表面类白色，或残存极少量浅棕色、深棕色或红棕色栓皮，有纵棱。偶见断续环节痕。质硬，较脆，断面淡黄白色或淡黄棕色。根木质部发达，具放射性纹理，断面可见黄色细小木心。形成层环明显。根茎髓部宽广。味微甘涩。

【鉴别】 本品粉末淡白色或淡棕色。菊糖众多，呈不规则块片状或呈扇形，散在或存在于薄壁细胞中。木纤维多成束，无色或黄棕色。木栓细胞棕黄色或红棕色，类长方形或不规则形。网纹导管及油细胞多见。偶见单细胞非腺毛，细长或缠绕，直径 3~10 μ m。

【检查】 水分 照水分测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）测定，不得过 10.0%。

总灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，30%乙醇作溶剂，不得少于 55.0%。

【性味】 二级干热，味淡，带黏性。

【功能与主治】 生干生热，补心壮阳，肥体填精，爽心悦志，燥湿固精，消除黄疸，温宫生辉。主治湿寒性或黏液质性疾病，如心悸阳痿，羸瘦精少，心烦意乱，早泄，遗精，滑精，黄疸，宫寒面暗。

【用法与用量】 4～6g。外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0008。

侧 柏 脂

Cebaizhi

سۇندۇرۇس

PLATYCLADI RESINA

本品为柏科植物侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco 的干燥树脂。割裂树干或待其树脂流出后，从枝干上刮取，阴干，即得。

【炮制】 除去杂质，用时破碎。

【性状】 本品呈不规则块状和颗粒状，多黏结成大小不等的团块。表面淡黄绿色、淡黄色至棕黄色或棕红色。被有黄白色粉末。质脆，破碎面不规则，透明或半透明，具光泽，嚼之易碎，味清凉、微苦。烧后味略臭。摩擦后略带静电，可吸附纸屑、毛发等轻小物体。

本品不溶于水，溶于乙醇、乙醚。

【检查】 杂质 不得过 1%（《中国药典》2020 年版四部通则 2301）。

水分 不得过 2.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法）。

【性味】 二级热，三级首干，味微辛酸。

【功能与主治】 收敛除湿、止血、杀虫、通经、利尿、壮寒性与胃湿性者肌腱，用于心悸、躁狂、痰性哮喘、癫痫性寒热病、脾症、腹泻等疾病的治疗。

【用法与用量】 3g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准
2017YC-0001。

炒 芫 荽 子

Chaoyuansuizi

CORIANDRI FRUCTUS

本品为伞形科植物芫荽 *Coriandrum sativum* L.的干燥成熟果实。
果实成熟时采收，晒干。

【炮制】 取净芫荽子，照清炒法（附录 I）炒至深棕色有香辣气。用时捣碎。

【性状】 本品为双悬果，呈圆球形或椭圆形，直径 3~5mm。表面深棕色，有较明显而纵直的次生棱脊 10 条及不甚明显而呈波浪形弯曲的初生棱脊 10 条，相间排列。顶端可见极短的柱头残迹及 5 个萼齿残痕，基部有小果柄或果柄痕。悬果瓣腹面中央下凹，具 3 条纵行的棱线，中央较直，两侧呈弧形弯曲。质脆，用手揉碎，有特异香气，味微辣。

【鉴别】 本品悬果瓣横切面：外果皮为 1 列厚壁细胞，内含少量草酸钙方晶。中果皮的外层为数列薄壁细胞；中层为厚壁木化纤维层，纤维纵横交错排列；内层为 2 列具壁孔的木化细胞；中果皮的初生肋线处有细小维管束，合生面有油管 2 个。内果皮为 1 列略透明的镶嵌细胞。种皮为 1 列扁平薄壁细胞，内含暗棕色物质；合生面的内果皮与种皮之间有种脊维管束。胚乳半月形，细胞壁较厚，内含糊粉粒及细小草酸钙簇晶。胚位于胚乳中间，由薄壁细胞组成，中央有子叶 2 片，细胞中充满糊粉粒。

粉末黄棕色。中果皮纤维极多，直径 9~12 μm ，壁厚，常纵横交错排列成束或块状。内果皮细胞狭长，壁菲薄，常数个细胞为一组，以其长轴作不规则方向嵌列。油管碎片黄棕色或红棕色，分泌细胞表面呈多角形，含棕色分泌物。木化细胞多角形，壁厚，壁孔明显。内胚乳细胞类多角形，含众多草酸钙簇晶，直径 3~9 μm ；油滴极多。

【性味与归经】 辛，平。归肺、胃经。

【功能与主治】 发表，透疹，开胃。用于感冒鼻塞，痘疹透发不畅，饮食乏味，齿痛。

【用法与用量】 5~10g。外用适量，煎汤含漱或熏洗。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 《湖北省中药饮片炮制规范》2018 年版 53 页。

胡 萝 卜 子

Huluobozi

ئۇرۇقى سەۋزە

CAROTAE SATIVAE FRUCTUS

本品为伞形科植物胡萝卜 *Daucus carota* var. *sativa* Hoffm. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，打下果实，晒干。

【炮制】 除去杂质，筛去灰屑。

【性状】 本品为双悬果，呈椭圆形，多裂为分果。分果长 3~5mm，宽约 1.2~2.5mm；表面黄棕色，顶端有花柱残基，基部钝圆，背面隆起，具 4 条窄翅状次棱，翅上密生 1 列黄白色刺，刺基部较宽，刺长约长 1~2mm，次棱间凹下处有不明显的主棱，其上散生短绒毛，接合面平坦，有 3 条脉纹，上具柔毛。种仁类白色，有油性。体轻。搓碎时有特异香气，味苦、微辛。

【鉴别】 本品粉末黄棕色。油管数个细胞组成，多角形、长方形或长条形，直径 50~120 μ m，多破碎，含黄棕色或深棕色分泌物。果皮表皮细胞类长圆形或三角形，壁厚，胞腔小。纤维条形，淡黄色，内含草酸钙方晶，形成晶纤维。非腺毛单细胞，棕黄色，壁厚。种皮表皮细胞，淡黄色，形状不规则。胚乳细胞含细小草酸钙簇晶和糊粉粒。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 20.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 11.0%。

【含量测定】 挥发油 照挥发油测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2204）测定。

本品含挥发油不得少于 1.5%(ml/g)。

【性质】 二级热，一级湿。

【功能主治】 生湿生热，利尿通淋，祛寒通经，调理经水，化排结石。用于干寒性或黑胆质性疾疾病，如小便不利，小便淋涩，闭经不通，经水不畅，肾脏结石，膀胱结石等。

【用法用量】 3～5g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0004。

哈 排 斯

Hapaisi

غاپهس

GENTIANAE OLIVERI HERBA

本品为龙胆科植物楔湾缺秦艽 *Gentiana oliveri* Grisebach 的干燥地上部分。夏季开花期采收，晒干。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性状】 本品呈不规则的段。茎略呈四棱形或近圆形，直径 0.1~0.2mm，黄绿色或带紫红色，有细纵纹及棱线，有节，体轻，质硬，易折断，断面中空。叶极少见，不完整。花冠筒状或狭钟状筒形，黄绿色、蓝紫色或棕黄色，裂片卵形或卵状披针形，先端两裂；雄蕊多数 5；子房有柄，柱头两裂；花萼筒膜质。气微，味苦微涩。

【鉴别】 （1）本品粉末淡黄棕色。纤维成束或散离，无色或棕黄色至棕红色；壁稍厚，平直或呈波状；或具纹孔。花冠表皮细胞表面观呈长方形，垂周壁微波状弯曲，壁略呈连珠状增厚；侧面观有乳头状突起；有的细胞含黄棕色或紫红色分泌物。花粉粒近球形或长球形，极面观类圆三角形，外壁两层，外层较厚，表面具浅雕纹，直径约至 48 μ m，具三孔沟。草酸钙簇晶直径约至 68 μ m，雄蕊处较为密集；草酸钙方晶散在；草酸钙针晶杆状，多存在于花冠薄壁细胞中。螺纹导管多数、梯纹及网纹导管可见。

（2）取本品粉末 1g，加甲醇 20ml，加热回流 30 分钟，滤过，

滤液定容至 25ml，作为供试品溶液。另取龙胆苦苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（10：2：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用 30%乙醇作溶剂，不得少于 25.0%。

【性味】 二级干，一级热，味苦。

【功能与主治】 清除异常黏液质和黑胆质；生干生热，祛寒补肝，散退湿热，利尿退肿，通肝通脾，发汗燥湿，祛风止痒，固发愈伤。主治湿寒性或黏液质性疾病。如慢性肝炎，陈旧性湿寒，全身水肿，小便不利，湿疹，皮肤瘙痒，斑秃及各种创伤。

【用法与用量】 6～7g。外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0005。

洋葱子

Yangcongzi

ئۈرۈقى پىياز

ALLII SEMEN

本品为百合科植物洋葱 *Allium cepa* L. 的干燥成熟种子。夏、秋季果实成熟时采收果序，晒干后打下果实，收集种子。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈不规则类半圆形或半卵圆形，略扁，长 3~4mm，宽 2~3mm，表面黑色，一面突起，皱缩，有细密的网状皱纹，另一面微凹，皱纹不甚明显，顶端钝，基部稍尖，种脐多为点状，种子剖开后可见类白色种仁。质硬。嚼之有洋葱的特异辛味。

【鉴别】 本品粉末棕黑色。种皮表皮细胞棕黄色，形状不规则，有微波状纹理，壁厚；下皮细胞类长方形；胚乳细胞充满糊化淀粉粒；子叶细胞含糊粉粒和脂肪油。

【检查】 杂质 不得过 5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2301）。

水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

过氧化值 不得过 0.30(《中国药典》2020 年版四部通则 2301)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》2020 年版四部通则 2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于 10.0%。

【含量测定】 脂肪油 取本品粗粉 1g,精密称定,置索氏提取器中,加乙醚适量,加热回流提取(8 小时)至脂肪油提尽,收集提取液,置已干燥至恒重的蒸发皿中,在水浴上低温蒸干,在 100℃干燥 1 小时,移置干燥器中,冷却 30 分钟,精密称定,计算,即得。

本品按干燥品计算,含脂肪油不得少于 9.0%。

【性质】 二级干热。

【功能与主治】 生干生热,兴奋性欲,祛寒壮阳,强筋养肌,固发生发,燥湿祛斑,祛湿止痒。用于湿寒性或黏液质性疾病,如寒性性欲减退,身寒阳痿,湿性筋肌虚弱,脱发斑秃,白病(白癜风)等。

【用法与用量】 3~5g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020-YC0008。

骆驼刺

Luotuoci

يانتاق

ALHAGII HERBA

本品为豆科植物骆驼刺 *Alhagi sparsifolia* Shap. 的干燥地上部分。夏季结果时采割地上部分，晒干。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性状】 本品呈不规则的段。茎表面灰绿色，有细纵皱纹，质稍硬，断面中部有髓。分枝部及叶腋有针刺，长可达 5cm。叶片多已脱落或皱缩、破碎，完整者呈倒卵形或椭圆形，长 0.5~2cm，宽 0.2~0.8cm，灰绿色，全缘。荚果串珠状弯曲，背缝线呈波状，不开裂；具 1~7 枚圆形种子。种子成熟时呈棕褐色。气微，味淡。

【鉴别】 取供试品粉末（过二号筛）约 3g，加 50%乙醇溶液 100ml，超声处理 30 分钟，离心（每分钟 5000 转），取上清液浓缩至干，残渣加水 20ml 使溶解，再加盐酸 1ml，摇匀，置热水浴回流 1 小时，迅速冷却，用三氯甲烷萃取 3 次，每次 20ml，合并，浓缩蒸干，残渣再加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取异鼠李素对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述溶液各 2~5 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5 : 2 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，在紫外灯（365nm）下检视。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显示相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 8.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用 50%乙醇作溶剂，不得少于 13.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.5%冰醋酸溶液（55：45）为流动相；检测波长为 360nm。理论塔板数按异鼠李素峰计算应不低于 4000。

对照品溶液的制备 取异鼠李素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约 2.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 70%甲醇 100ml，超声处理（功率 350W，频率 59KHz）30 分钟，放冷，离心，取滤液浓缩，残渣加甲醇-25%盐酸溶液（4：1）混合溶液 25ml，置水浴中加热水解 1 小时，立即冷却，转移至 50ml 量瓶中，用适量甲醇洗涤容器，洗液并入同一量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10~20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含异鼠李素($C_{16}H_{12}O_7$)含量不得少于 0.050%。

【性质】 二级湿热。

【功能与主治】 清除异常胆液质、镇痛、解郁补脑。用于内热便秘、头痛、关节痛、白内障等。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0003。

铁 力 木

Tielimu

نارمشکی

MESUAE FERREAE FLOS

本品为藤黄科植物铁力木 *Mesua ferrea* L. 的干燥花蕾。3~5 月花开放前采收，阴干。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈类球形，直径 0.5~0.7cm，先端有尖，长约 1mm，花柄长 0.5~2.5cm，花柄尾端呈盔帽状，多数残留。花萼表面浅棕至棕红色，可见细纵纹理。花瓣 4 枚，红棕色，倒卵状楔形，覆瓦状排列，外方 2 枚较内方 2 枚略大。雄蕊极多数，丝状，黄棕色；子房圆锥形，2 室，柱头盾形；亦有无雌蕊的单性花。体轻，质脆。气清香，味淡、微苦。

【鉴别】 （1）本品粉末黄棕色至红棕色。花萼表皮细胞淡棕色，垂周壁念珠状增厚，含草酸钙簇晶，气孔平轴式。花瓣表皮细胞无色或淡棕色，类方形或不规则形，含草酸钙簇晶，垂周壁略呈波状弯曲。花粉粒长球形或近球形，直径约至 48 μ m，具 3 孔沟，表面具模糊的网状雕纹。草酸钙簇晶众多，直径约至 55 μ m。

（2）取供试品 1g，加甲醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液加 5ml 稀盐酸，90℃，水解 30 分钟，水浴蒸干，残渣加 5ml 甲醇溶解，滤过，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品 1.2mg，加甲醇制

成每 1ml 含 0.12mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1 μ l，分别点于同一高效硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5 : 2.6 : 0.6）为展开剂展开，取出，晾干，喷以 1%三氯化铝乙醇溶液显色，置紫外灯（366nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 11.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用 70%乙醇作溶剂，不得少于 16.0%。

【性味】 二级干热，味苦。

【功能与主治】 生干生热，温补心脏，爽心悦志，热身壮阳，燥湿补胃，止泻，敛疮，止血消痔。主治湿寒性或黏液质性疾病，寒性心虚，忧郁症，神经衰弱，身寒阳痿，湿性胃虚，腹泻及各种湿疮，痔疮出血。

【用法与用量】 3~5g。外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0011。

琥 珀

Hu po

کهەرؤا

SUCCINUM

本品为古代松科松属植物的树脂，埋藏地下经年久转化而成的化石样物质。全年均可采收，除去泥沙及煤屑。

【炮制】 除去杂质，用时粉碎。

【性状】 本品呈不规则块片或粗颗粒状。表面淡黄色、黄棕色或至深棕色、血红色；光滑或凹凸不平；透明至半透明；具树脂样光泽。体较轻，质较酥脆，研之易碎。摩擦带电，可吸附纸屑、毛发等轻小物体。气微或微有松脂味，味淡，嚼之无砂砾感。

煤珀 为不规则多角形或颗粒状。表面淡黄色、黄棕色或至深棕色、黑褐色。有光泽，质坚硬，研之不易碎。断面有玻璃样光泽。燃之有微青黑色烟，熄灭时有白烟。气微或微有煤油味，味淡，嚼之无砂砾感。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡棕黄色或棕色。琥珀属非晶质均质体，于偏光镜下全黑，无偏光特性。

取琥珀细粉 0.5g，置烧杯中，加石油醚 10ml，超声处理 10 分钟，滤过，取滤液，加 1%的乙酸铜溶液 10ml，石油醚层应为无色。

【检查】 杂质 不得过 3%（《中国药典》2020 年版四部通则 2301）。

水分 不得过 2.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四

法)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 50.0%。

【性味】 寒热中等，二级干，味微辛。

【功能与主治】 生干止血，燥湿止泻，爽心悦志，防腐生肌，健胃补肾，通利小便。主治各种内外出血，痢疾带血，心虚心烦，各种创伤，胃肾两虚，小便不畅。

【用法与用量】 1.5g。外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0004。

黑 木 耳

Heimuer

مور

AURICULARIAE FRUCTIFICATIO

本品为木耳科真菌木耳 *Auricularia auricula* (L.ex Hook) Underw. 的干燥子实体。主产于甘肃、陕西、四川等地。夏秋季采收，晒干。

药材以肥厚、完整、紫褐色者为佳。

【炮制】 黑木耳 取原药材，除去杂质，洗净，晒干。用时打碎。

炒黑木耳 取净黑木耳，置锅内，用文火加热，炒至表面稍变色时，出锅，放凉。用时捣碎。

醋制黑木耳 取净黑木耳，加醋拌匀，晒干。

每净木耳 10kg，用米醋 5kg。

【饮片规格】 黑木耳 无破碎、无杂质。

炒黑木耳 表面不焦。

醋黑木耳 有醋香气，味酸。

【性状】 黑木耳 呈不规则块状，多卷缩。表面光滑，呈黑褐色或紫褐色。近革质，质脆，易折断。以水浸泡则膨胀，色泽转淡，呈棕褐色，柔润而微透明，表面有滑润的黏液。气微香，味淡。

炒黑木耳 形如黑木耳。质更脆。

醋黑木耳 形如黑木耳。具醋香气，味酸。

【检查】 总灰分 本品不得过 4.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 本品不得过 0.8%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【性味与归经】 甘，平。归胃、大肠经。

【功能与主治】 补气养血，止血，润肺止咳，降压，抗癌。用于肠风，血痢，血淋，崩漏，痔疮，肺虚久咳，高血压，子宫颈癌，阴道癌。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 《甘肃省中药饮片炮制规范》2009 年版 280 页。

黑 果 越 橘

Heiguoyueju

قارا جىيىدەك

MYRTILLI HERBA

本品系哈萨克族习用药材，为杜鹃花科植物黑果越橘 *Vaccinium myrtillus* L.的干燥地上部分。夏、秋二季开花时采割，阴干。

【炮制】 除去杂质，切段。

【性状】 本品呈不规则的段。茎圆柱形，表面颜色灰绿色或黄绿色，无毛，具锐棱，质硬而脆，易折断。断面略平整而质密，皮部黑褐色或灰绿色，木部黄白色。叶卵形，边缘具细锯齿，两面无毛，叶脉纤细，脉络清晰，叶表面平坦，背面突起。气微，味微。

【鉴别】 （1）本品粉末黄绿色。茎表皮细胞类长方形，内含簇晶及方晶；气孔不定式。淀粉粒单粒，层纹不明显，脐点棒状或不明显。纤维成束。螺纹导管众多。

茎横切面:表皮为2~3列薄壁细胞或有时脱落，多角形，壁略增厚。皮层为数列薄壁细胞。韧皮部狭窄。木质部由导管、木纤维组成，导管环状排列或呈放射状排列，有时均木化。可见形成层。中央有髓，内含淀粉粒。

（2）取本品粗粉0.1g，加甲醇10ml，超声10分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml溶解作为供试品溶液。另取金丝桃苷对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0502）试验，吸取上述供试品溶液和对照品溶液各3μl分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（8：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%三氯化铝

溶液，加热，置紫外灯365nm下检视，供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 9.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0328）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 15.0%。

【功能与主治】 苦，凉；散风止痛，解毒利尿，收敛止泻，滋补强壮。用于肾炎，尿路感染，肠炎腹泻，体虚，腰膝酸软，前列腺炎。

【用法与用量】 5～10g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2018YC-0001。

穆 库 没 药

Mukumoyao

مؤقهل

COMMIPHORAE MUKUL RESINA

本品为橄榄科植物穆库没药树 *Commiphora mukul* (Hook. ex Stocks) Engl. 的干燥树脂。7、8 月间割裂树干，使树脂流出，10 月至次年 2 月采收，阴干。

【炮制】 除去杂质，用时粉碎过二号筛，用韭菜汁溶解备用。

【性状】 本品呈大小不等的团块状，常黏有原植物树皮或残枝。表面黄棕色至棕褐色，半透明或不透明。破碎面有蜡样或玻璃样光泽。遇热软化变粘，冷时质脆。具特异香气，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品少量，用微火灼烧，有多烟火焰，具特异香气。

(2) 取本品 0.1g，加水 10ml，振摇，有泡沫产生，溶液呈乳白色至浅棕色，杂质越少，溶液色越白。

(3) 取本品 0.5g，置锥形瓶中，加石油醚 10ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液加 1%的乙酸铜溶液 10ml，石油醚层应为无色。掺伪品久置石油醚层蓝绿色变深，下层溶液可见絮状物或变浑浊。

【检查】 水分 不得过 5.0% (《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法)。

总灰分 不得过 8.0% (《中国药典》2020 年版四部通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【性味】 二级干，三级热，味淡。

【功能与主治】 清除异常黏液质，生干生热，软坚消肿，强筋养肌，润肠通便，止咳化痰，消炎止痛，除湿、止血、通经、利尿。主治湿寒性或黏液质性疾疾病，如痔疮肿胀、颈淋巴结核，瘫痪，面瘫，肢颤症，大便不畅，咳嗽，痰多，小关节痛、坐骨神经痛。

【用法与用量】 3～6g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

【药材标准来源】 新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2017YC-0012。