

地 丁 草

Didingcao

VIOLAE PRIONANTHAE HERBA

【处方用名】 鲜地丁草、地丁草。

【来源】 本品为堇菜科植物早开堇菜 *Viol prionanth Bunge* 的干燥全草或鲜品。主产于甘肃等地。春、夏二季采收，除去杂质，鲜用或晒干。

药材以叶、茎色绿者为佳。

【炮制方法】 鲜地丁草 取新鲜品，除去杂质，抢水洗净，沥去水。用时捣烂。

地丁草 取原药材，除去杂质，抢水洗净，切段，干燥，筛去灰屑。

【饮片规格】 鲜地丁草 为新鲜的全草。无杂质、无枯叶。

地丁草 段长 10~15 mm。茎、叶、花、果混合。

【成品性状】 鲜地丁草 根呈圆锥形，长 10~15 mm；表面黄白色。叶灰绿色，完整者展开呈卵形或卵状披针形，长 3~5 cm，宽 0.5~1.2 cm，先端钝，基部平截或微心形，叶缘锯齿状，两面有疏毛，叶柄上部有狭翅。花茎纤细，花瓣 5，紫堇色，花距细管状。蒴果椭圆形，常开裂；种子多数，淡棕色。质柔软。气微，味微苦。

地丁草 段长 10~15 mm。根呈圆锥形，表面黄白色。叶灰绿色，完整者展开呈卵形或卵状披针形，先端钝，基部平截或微心形，叶缘锯齿状，两面有疏毛，叶柄上部有狭翅。花茎纤细，花瓣 5，紫堇色，花距细管状。蒴果椭圆形，常开裂；种子多数，淡棕色。质脆。气微，味微苦。

【鉴别】 本品叶表面观：下表皮细胞呈长方形或类多角形，垂周壁波状弯曲，呈串珠状增厚，局部可见角质纹理。表皮有单细胞非腺毛，长 95~133 μm，直径 21~30 μm，壁厚 4~8 μm，呈微波状，表面具明显疣状突起。气孔不等式，副卫细胞 3~4 个。上表皮细胞大于下表皮细胞，垂轴壁平直，可见细小串珠状增厚。

叶脉横切面：上表皮 1 列细胞，切向延长，外具角质层。皮层宽广，主脉区的上、下表皮层之内方各有 1~2 列厚角细胞。栅状细胞 1~2 列。主脉区上下均呈凸起状。主脉维管束外韧型，常 1 个，木质部导管放射状排列。薄壁细胞中含

草酸钙小簇晶。

【性味与归经】 苦、辛，寒。归心、肝经。

【功能与主治】 清热解毒，散结消肿。用于疔疮肿毒，痈疽发背，丹毒，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 15～30g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【处方应付】 写鲜地丁草（鲜地丁）付鲜地丁草；写地丁草（地丁）付地丁草。

【贮藏】 置通风干燥处。