

## 蒉 萝 子

Shiluozi

### ANETHI FRUCTUS

【处方用名】 蒉萝子、盐蒉萝子。

【来源】 本品为伞形科植物蒉萝 *Anethum graveolens* L.的干燥成熟果实。主产于甘肃、四川等地。夏季果实成熟时采收果枝，晒干，打落果实，除去杂质。药材以颗粒饱满、色深、气味芳香者为佳。

【炮制方法】 蒉萝子 取原药材，除去杂质及果柄，筛去灰屑。

盐蒉萝子 取净蒉萝子，用盐水拌匀，闷润至透，置锅内，用文火加热，炒至有香气逸出时，出锅，放凉。

每净蒉萝子 100kg，用食盐 2kg。

【饮片规格】 蒉萝子 纯净饱满，有特殊香气。无杂质。

盐蒉萝子 微鼓起，色变深。味微咸。

【成品性状】 蒉萝子 多数为分果，每一分果呈扁平宽卵形，长 3~4.5mm，宽 1.5~3mm。表面棕黄色、棕褐色，有凸起的纵肋 3 条，两侧向外延伸成翅状。两分果的接合面平坦而宽广。种子 1 枚，富油性。气芳香，味辛，麻舌。

盐蒉萝子 形如蒉萝子。微鼓起、色变深。味微咸。

【鉴别】 本品粉末黄棕色。表皮细胞类多角形。镶嵌细胞狭长，排列整齐，以长轴不规则方向嵌列，常与中果皮细胞相连。内胚乳细胞多角形，内含草酸钙小簇晶及糊粉粒。油细胞黄棕色，分泌细胞呈不规则形。

【检查】 杂质 不得过 4% (中国药典 2015 年版四部通则 2301)。

水分 不得过 12.0%(中国药典 2015 年版四部通则 0832 第四法)。

总灰分 蒉萝子不得过 10.0%，盐蒉萝子不得过 12.0% (中国药典 2015 年版四部通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 2.0% (中国药典 2015 年版四部通则 2302)。

【含量测定】 照挥发油测定法 (中国药典 2015 年版四部通则 2204)测定，含挥发油蒉萝子不得少于 2.5% (ml/g)，盐蒉萝子不得少于 1.0% (ml/g)。

【性味与归经】 辛，温。归肝、肾、脾、胃经。

【功能与主治】 蒉萝子散寒止痛，理气和胃；用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛

经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻，睾丸鞘膜积液。盐苘蓼子暖肾散寒止痛；用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，经寒腹痛。

【用法与用量】 3～6g。

【处方应付】 写苘蓼子付苘蓼子；写盐(炙)苘蓼子付盐苘蓼子。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防虫蛀。