

瘰 桃 干

Bietaogan

PRUNI PERSICAE FRUCTUS

【处方用名】 瘰桃干、桃奴、碧桃干。

【来源】 本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica*(L.) Batsch.或山桃 *Prunus davidiana*(Carr.) Franch.的干燥未成熟果实。主产于甘肃、江苏、浙江等地。4至6月采收，或拾取自落的未成熟果实，除去杂质，晒干。核已硬化者习称“瘰桃干”，核未硬化者习称“桃奴”。

【炮制方法】 取原药材，刷去果皮上的绒毛，拣去杂质，除去果梗，洗净，晒干。用时捣碎。

【饮片规格】 纯净干瘰果实，无杂质。

【成品性状】 瘰桃干 呈扁卵形或扁椭圆形，长2~4cm，直径2~3cm，厚1~2cm。表面黄绿色或棕黄色，具网状皱缩纹理，密被黄白色绒毛，先端渐尖，鸟喙状，中部膨大，基部不对称，有的残留棕色果柄。质硬坚，破开，断面内果皮厚而硬化，内含未成熟种子一枚，种皮以内呈空洞状。气微，味微酸涩。

桃奴 呈扁压状卵形，长1~2cm，宽1~1.5cm，厚0.4~0.8cm。表面绒毛更明显。质软，断面内果皮较薄，未硬化。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕黄色。非腺毛众多，单细胞，淡黄色，多自基部断离，呈纤维状，微弯，长33~612(~2700)μm，直径17~40μm，壁厚，表面有螺纹状角质纹理。内果皮石细胞成片，呈类圆形、类方形或不规则形，直径14~45μm，壁较薄，微木化，纹孔、孔沟细密明显。可见草酸钙簇晶，直径7~21μm。

(2) 取本品粗粉2g，加水20ml，加热微沸15分钟，趁热过滤，取滤液滴于滤纸上，干后喷以0.1%溴酚蓝乙醇液，即显蓝色斑点。

(3) 取【鉴别】(2)项下滤液5滴，置白色点滴板内，加三氯化铁试液1滴，显污绿色或褐绿色。

【性味与归经】 酸、苦、平。归肺、肝经。

【功能与主治】 敛汗止血。用于盗汗、虚汗、吐血、妊娠下血。

【用法与用量】 5~10g。

【处方应付】 写瘰桃干、桃奴、碧桃干均付瘰桃干。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉变，防虫蛀。

甘肃地方标准