

梧 桐 子

Wutongzi

FIRMIANAE SEMEN

【处方用名】 梧桐子。

【来源】 本品为梧桐科植物梧桐 *Firmiana simplex* (L.)W.F.Wight 的干燥成熟果实。主产于江苏、浙江、河南、湖北、四川等地，甘肃亦产。11~12 月果实成熟时采收果实，除去杂质，晒干。

药材以籽粒饱满、微具光泽、种仁富油性，质坚硬者为佳。

【炮制方法】 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。用时捣碎。

【饮片规格】 呈圆球形，微具光泽，内胚乳富油性。无杂质，无虫蛀。

【成品性状】 本品呈圆球形，直径 5~8mm。表面黄棕色至棕色，微具光泽，具明显隆起的网状皱纹，质轻而硬。除去种皮，可见淡红色的数层外胚乳。内胚乳类白色，富油性；子叶 2 片，薄而大，黄色，紧贴于内胚乳上。气微，味微甜。

【鉴别】 取本品粗粉 2g，加 0.5%盐酸溶液 10ml，温浸 20 分钟，滤过，取滤液 1ml，滴加碘化铋钾试液 2~3 滴，生成桔黄色沉淀。另取滤液 2ml，滴加硅钨酸试液 2 滴，生成乳白色沉淀。

【含量测定】 取本品粗粉约 4g，精密称定，置 250ml 索氏提取器中，加乙醚 100ml，回流提取至乙醚无色，滤过，滤液置已干燥至恒重的蒸发器皿中，在水浴低温蒸去乙醚，在 105℃干燥 1 小时，精密称定，即得。

本品含脂肪油不得少于 20.0%。

【性味与归经】 甘，平。归心、肺、肾经。

【功能与主治】 顺气，健胃消食。用于伤食腹泻，胃脘疼痛，疝气，小儿口疮，血热型须发早白。

【用法与用量】 3~9g。

【处方应付】 写梧桐子付梧桐子。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉变，防虫蛀。